


## COMO RECONOCER A UNA SERPIENTE VENENOSA





## SERPIENTES VENENOSAS DE CÓRDOBA

(Guía para Médicos)

### YARARÁ CHICA *Bothrops neuwiedi*



#### PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local intensa que progresa: dolor, edema, cianosis. Trastornos de coagulación, luego pueden sobrevenir hemorragias.

#### TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa (preferentemente) o intramuscular antiveneno (suero antiofídico) específico



### VÍBORA DE LA CRUZ *Bothrops alternatus*



#### PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local intensa que progresa: dolor, edema, cianosis. Trastornos de coagulación, luego pueden sobrevenir hemorragias.

#### TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa (preferentemente) o intramuscular antiveneno (suero antiofídico) específico



### YARARÁ ÑATA *Bothrops ammodytoides*



#### PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local intensa que progresa: dolor, edema, cianosis. Trastornos de coagulación, luego pueden sobrevenir hemorragias.

#### TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa (preferentemente) o intramuscular antiveneno (suero antiofídico) específico



### CASCABEL *Crotalus durissus*



#### PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local leve. Veneno de acción hemolítica y neurotóxica: dolor, diplopía, parálisis musculares con tendencia a la generalización

#### TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa antiveneno (suero antiofídico) específico



### CORAL *Micrurus pyrrhocryptus*



#### PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local leve. Manifestaciones generales muy intensas. Parálisis musculares precoces, tipo "curarización" que dominan el cuadro.

#### TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa antiveneno específico. El envenenamiento por coral es de muy rápida evolución.

